



200998-100

ノルディア[®]シスタチンC用
シスタチンC コントロール

使用説明書

本品は、ノルディア[®]シスタチンCを使用し、血清又は血漿中のシスタチンCを測定する際に、データ管理用として使用するものです。

〔使用法〕

本品をそのまま使用します。

〔取扱い上の注意事項〕

1. 本品は、ノルディア[®]シスタチンC用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、HBs抗原陰性、HIV抗体陰性、HCV抗体陰性を確認したヒト由来成分を含んでおります。ご使用の際には感染の危険のあるものとして、検体と同様に十分ご注意の上、お取り扱いください。
3. 本品には、防腐剤としてプロクリン 300 が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

〔包装〕

2mL × 2濃度 × 3

〔貯 法〕

2～10℃

〔使用期限〕

外装に表示してあります。

ノルディア[®]シスタチンCでの参考測定値

シスタチンCコントロールⅠ : 0.5mg/L (中央値 0.5 ± 0.2)

シスタチンCコントロールⅡ : 2.0mg/L (中央値 2.0 ± 0.4)

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋三丁目13番5号